IMT Nuremberg Archives

H – 4564

International Court of Justice

H4564 – 0001

H4564 – 0002

OFFICE OF CHIEF OF COUNSEL FOR WAR CRIMES

EVIDENCE DIVISION

Date : 26.8.48

I certify that Document Number F-185a was introduced into evidence as Exhibit Number RF-387 in the Trial by the International Military Tribunal of Hermann GOERING, et al, which commenced on 20 November 1945, and that the attached photostat is a true and correct copy of the original.

Fred Niebergall

Fred NIEBERGALL
Chief, Document
Control Branch.

H4564 - 0003

C E R T I F I C A T E

I hereby certify that the annexed document F-185-a No. RF-387 is a photostat of an original document submitted in evidence by the ~~United States~~ French Prosecution under this number. The original document has been withdrawn in accordance with Rule 10 of the International Military Tribunal, and to the best of my knowledge and belief is to be held at the National Archives, Washington D.C. .

Nürnberg, 20.8.48

Paul Joosten

PAUL A. JOOSTEN

General Secretary
International Military
Tribunal

H4564 – 0004

OFFICE OF U.S. CHIEF OF COUNSEL
FOR THE PROSECUTION OF AXIS CRIMINALITY
APO 413 Date 14 August 1945

Doc. No. L105

STAFF EVIDENCE ANALYSIS

DESCRIPTION OF ATTACHED DOCUMENT (Under following headings)

Title and Nature: AXIS TREATMENT OF WOMEN--No. 7 in series on conditions in Occupied Territories issued by the Inter-Allied Information Committee

Date: Undated, probably early 1943 Original ( ) Copy (x) Language: English

If not English, is translation attached: Yes ( ) No ( )

LOCATION OF ORIGINAL (also WITNESS if applicable) as of 14 August 1945:

OCC London (printed copy)

PERSONS IMPLICATED:

REFERENCES TO INDEX HEADINGS (Key to Par. nos of Summary below):
ATROCITIES: Against Civilians (entire document): FORCED LABOR (6)(7)(8)

NECESSARY PROCESSING TO PUT IN EVIDENTIARY FORM; LEADS:

Report issued by agency of 19 of governments of United Nations and is presumably evidentiary. For leads see para. 9 and 11 below.

SUMMARY OF RELEVANT POINTS (with page references):

1. Report describes atrocities in various occupied countries with particular reference to mistreatment of women.

2. Belgium: Executions of husbands and children described. Women imprisoned and executed for sabotage and aiding Allied flyers. Women treated brutally by Gestapo. pp. 4-6.

3. Czechoslovakia: Women's organizations dissolved. Women raped, tortured, killed and deported. Whole families exterminated. At least 1000 women killed. pp. 9-10.

4. France: Because death penalty for women so abhorent to French, Germans did not execute many, but sent lots to concentration camps for participation in resistance. pp. 10-12.

5. Greece: Germans executed and mistreated women. Bulgars drove women out into cold and famine. pp. 12-14.

6. Luxembourg: Women's organizations dissolved and women sent into Germany into Forced Labor. When first contingent of girls left for Germany, Gauleiter Gustav Simon proclaimed: "I have good news for you. Henceforth, young Luxembourg girls will be able to go to Germany in order to work there during six months for our Fuehrer, and they will be proud to return as German mothers". pp. 14-15.

7. Netherlands: About 50,000 Dutch girls estimated to be working in Germany--and they were rebellious. Women imprisoned for small offenses. pp. 15-16.

(continued)

8. Norway: German attacks in Norway concentrated against men. They took over women's organizations and did put some women into concentration camps where they died. Women put into forced labor in Norway. pp. 16-18.

9. Poland: Women executed and mistreated as badly as men. 3000 put into concentration camp at MECKLENBURG and very badly mistreated. Many girls seized and sent to brothels for soldiers. Reports made by Cardinal HLOND, the Polish Primate to Pope Pius XII record a number of well-documented facts which show tragic fate of Polish girls. pp. 19-21.

10. USSR: Robbery, massacre, and rape. Diary of Friedrich Schmidt, secretary of 626 the Group of Secret Police attached to first German Tank Army displays horrible atrocities; murders, flogging, etc. pp. 22-23.

11. Yugoslavia: Germans pass bodies mutilated in torture to the hangman's noose. Of such behavior the Yugoslav government possesses satisfactory evidence which shall at the proper time be presented. pp. 24-26.

12. Report also includes section on British women in Far East (pp. 6-7), China (7-8) and the Philippines (pp. 18-19).

Note: "Treatment of Women" is not a particularly convenient category of crimes for purposes of trial. The Nazis brutalized whomsoever they chose, regardless of sex or age. Since men were more dangerous potentially as opposition, and more useful as heavy laborers, they seem to have suffered most. While many atrocities were directed against women, they seem to have suffered more in an indirect way by having their men taken away and by watching their children starve. One undesirable feature of report is that it glamorizes opposition of women in occupied countries to Germans, such as aiding Allied flyers, etc. More direct evidence on points covered in report would be desirable.

Krieger

NOTE: DO NOT MARK, UNDERLINE OR OTHERWISE DEFACE ATTACHED DOCUMENT DOC NO. 1105

H4564 - 0005

Document 188 A. 2.103

188 A. 2.103

TRADUCTION

Le Medecin du Gouvernement du Reich-
S.S. & Police.
Le Medecin Chef

Tgb. Nr. Geh.364/44 Dr. Mru./Eb.

Berlin- Zehlendorf 6, le I2 Septembre I944
Spanische Allee IO-I2.

28

Londres

Extremement secret

Experiences avec des projectiles a l'azotate d'aconitine.

A l'Institut de technique
criminelle .
Berlin.

En présence du SS Stubaf, du Dr. Ding, du Dr. Widmann et du soussigné, des expériences furent poursuivies sur cinq sujets condamnés a mort, le II Septembre I944 avec des projectiles au nitrate d'aconitine. On utilisa des balles d'un calibre de 7,65 mm. remplies de poison sous forme cristalline. Chacun des sujets reçut un coup de feu dans la cuisse gauche en position couchée. Dans deux cas, la balle traversa complètement la cuisse sans produire aucun effet toxique. Ces deux cas furent éliminés comme sans intérêt en vue de l'expérience.

La plaie ne présenta aucun caractère particulier. Dans un cas l'artère fémorale fut perforée , determinant une hémorrhagie qui fut arrêtée au bout d'un court instant. La perte de sang fut estimée à 3/4 de litre au maximum et par conséquent n'a pas pu causer la mort .

Les trois sujets restants manifestèrent des symptomes etonnamment semblables les uns aux autres. Tout d'abord , rien de particulier ne se manifesta . Au bout de 20 a 25 minutes, une certaine agitation accompagnée de salivation fit son apparition , mais se calma par la suite.

Au bout de 40 a 44 minutes, commenca une salivation abondante. Les sujets avalent fréquemment , mais la salivation est si forte qu'elle ne peut être entièrement déglutie et apparait à la bouche sous une forme mousseuse. Puis commence une irritation de la gorge et les sujets se mettent a vomir.

Dans deux cas sur trois le pouls devient incomptable au bout de 58 minutes. Le troisième présente un pouls qui bat a 76, au bout de 65 minutes sa pression arterielle tombe a 90 maxima sur 60 minima. Les bruits du coeur sont très faibles expliquant l'importante chute de tension arterielle.

Au cours de la première heure de l'expérience, les pupilles ne manifestent aucun changement. Au bout de 78 minutes, les trois sujets presentèrent une mydriase modérée et une réaction ralentie à la lumiere. Au même moment la respiration s'accélère mais avec des inspirations profondes. Au bout de quelques minutes ces phenomènes diminuent d'intensité, les pupilles redeviennent normales et le reflexe lumineux s'améliore.

Au bout de 65 minutes, les réflexes patellaires et achilléens disparaissent. Dans deux cas, les reflexes abdominaux disparaissent également, dans le troisième, les réflexes abdominaux, sus ombilicaux se maintiennent et les sous ombilicaux disparaissent.

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL
NUREMBERG, GERMANY
Exhibit No. 38 R
Filed 1/31/46

B 49643

H4564 – 0006

Au bout de 90 minutes, un des sujets se mit a respirer profondement de nouveau et a manifester une agitation croissante. Apres quoi, la respiration devint rapide et superficielle. Au même moment ce sujet présenta des eructations sans toutefois parvenir a vomir, bien qu'il mit son doigt dans sa gorge . Sa figure se congestionnait pendans ses efforts.

Les deux autres sujets avaient pâli des le début de l'expérience. Les autres symptomes étaient analogues a ceux du troisième. L'agitation devint finalement si violente que les sujets presentaient de l'opisthotonos, se rejetaient en arrière, roulaient leurs yeux et agitaient leurs bras et leurs mains de facon incoordonnée. Finalement l'agitation diminua , les pupilles se dilatèrent au maximum et les condamnés restèrent immobiles. Dans l'un des cas, du trismus et de l'incontinence d'urine furent observés. La mort survint respectivement I2I, I23 et I29 minutes apres le coup de feu.

Conclusion Des balles chargées d'environ 38 Mgrs. dazotate d'aconitine entrainèrent la mort en 2 heures malgré le caractère superficiel de la blessure . Les principaux symptômes observés furent de la salivation , de la mydriase, l'abolition des reflexes, de l'agitation et de violentes eructations.

Signe : Doc. (Professeur)
Dr. Mrugowsky
SS Commandant en chef et
Chef de Service.

B 49644

H4564 – 0007

H4564 – 0008

TRADUCTION

Medecin du Gouvernement du
ich - S.S. & Police.
e Medecin Chef

Berlin- Zehlendorf 6, le I2 Septembre I944
Spanische Allee I0-I2.

Extrememement secret

Experiences avec des projectiles a l'azotate d'aconitine .

A l'Institut de technique criminelle.
Berlin.

En présence du SS Stubaf, du Dr. Ding, du Dr. Widman et du soussigné, des expériences furent poursuivies sur cinq sujetscondamnes a mort, le II Septembre I944 avec des projectiles au nitrate d'aconitine. On utilisa des balles d'un calibre de 7,65 mm. remplies de poison sous forme cristalline. Chacun des sujets recut un coup de feu dans la cuisse gauche en position couchée. Dans deux cas, la balle traversa complètement la cuisse sans produire aucun effet toxique. Ces deux cas furent éliminés comme sans intéret en vue de l'expérience.

La plaie ne présenta aucun caractère particulier. Dans un cas, l'artère fémorale fut perforée, determinant une hemorrhagie qui fut arrêtée au bout d'un court instant. La perte de sang fut estimée à 3/4 de litre au maximum et par conséquent n'a pas pu causer la mort.

Les trois sujets restants manifestèrent des symptomes étonnamment semblables les uns aux autres. Tout d'abord, rien de particulier ne se manifesta. Au bout de 20 aux 25 minutes, une certaine agitation accompagnée de salivation fit son apparition, mais se calma par la suite.

Au bout de 40 a 44 minutes, commenca une salivation abondante. Les sujets avalent fréquemment, mais la salivation est si forte qu'elle ne peut etre entièrement déglutie et apparait à la bouche sous une forme mousseuse. Puis commence une irritation de la gorge et les sujets se mettent a vomir.

Dans deux cas sur trois, le pouls devient incomptable au bout de 58 minutes. Le troisième présente un pouls qui bat a 76, au bout de 65 minutes sa pression artérielle tombe a 90 maxima sur 60 minima. Les bruits du coeur sont très faibles expliquant l'importante chute de tension artérielle.

Au cours de la première heure de l'expérience, les pupilles ne manifestent aucun changement. Au bout de 78 minutes, les trois sujets presentèrent une mydriase modérée et une réaction ralentie a la lumiere. Au même moment, la respiration s'accelère mais avec des inspirations profondes. Au bout de quelques minutes ces phénomenes diminuent d'intensité, les pupilles redeviennent normales et le reflexe lumineux s'améliore.

Au bout de 65 minutes, les reflexes patellaires et achilléens disparaissent. Dans deux cas, les reflexes abdominaux disparaissent également, dans le troisième, les réflexes abdominaux, sus ombilicaux se maintiennent et les sous ombilicaux disparaissent.

B 49645

Au bout de 90 minutes, un des sujets se mit a respirer profondement de nouveau et à manifester une agitation croissante. Après quoi, la respiration devint rapide et superficielle. Au même moment ce sujet présenta des eructations sans toutefois parvenir a vomir, bien qu'il mit son doigt dans sa gorge. Sa figure se congestionnait pendant ses efforts.

Les deux autres sujets avaient pali dès le debut de l'expérience. Les autres symptomes étaient analogues a ceux du troisième. L'agitation devint finalement si violente que les sujets présentaient de l'opisthotonos, se rejetaient en arrière, roulaient leurs yeux et agitaient leurs bras et leurs mains de façon incoordonnee. Finalement l'agitation diminua, les pupilles se dilatèrent au maximum et les condamnes restèrent immobiles. Dans l'un des cas, du trismus et de l'incontinence d'urine furent observés. La mort survint respectivement I2I, I23 et I29 minutes après le coup de feu.

Conclusion. Des balles chargées d'environ 38 Mgrs. d'azotate d'aconitine entrainerent la mort en 2 heures, malgré le caractère superficiel de la blessure. Les principaux symptomes observés furent de la saliv tion, de la mydriase, l'abolition des reflexes, de l'agitation et de violentes eructations.

Signe: Doz (Professeur)
Dr. Mrugowsky
SS. Commandant en Chef et
Chef de Service.

B 49646

H4564 – 0009

H4564 - 0010

RF -387

17-4564

TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL des GRANDS CRIMINELS de GUERRE
MINISTÈRE PUBLIC
DÉLÉGATION FRANÇAISE

traduction de l'original.

DOC. R.F. N° 387

Document L. 103

Filed Jan 31, 1946

B 49642

3

F-1852 RF 387 (vide USA 467)

H4564 – 0011